

SCHEMA Pleuramesotheliom

| Jahre nach Primärtherapie | 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | ab 6 |
|--|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|
| Monate nach Primärtherapie | 4-6 Wo. | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 (**) |
| Anamnese | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Körperliche Untersuchung | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lungenfunktion (*) u. SO ₂ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Labor | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | • | | • | |
| Diagnostische Untersuchungen | symptom- und therapieorientierte Untersuchung je nach Beschwerdebild und / oder auffälligem Befund: Bronchoskopie, Skelettszintigramm, Rö.-Thorax, Rö.-Skelett, CT Thorax, Oberbauch-Sonographie, 2-Ph. CT Abdomen mit KM, MRT, CT bzw. MRT-Schädel | | | | | | | | | | | | | | | |

Individuelle Änderungen sind möglich

(*) Diffusion / BGA bei vorbekannten Einschränkungen bzw. antiobstruktiver Therapie

(**) weiter je nach Risiko

Anamnese: AZ, Appetit, Gewicht, Husten, Atemnot, Auswurf, Heiserkeit, Herz, Schmerzen (Charakter), Kopfschmerzen, Schwindel, Gefühlsstörungen, Müdigkeit, Schwäche, Antriebsarmut

Körperliche Untersuchung: Gewicht, Puls, Blutdruck, Inspektion (Knöchelödeme?), Palpation LAB, Narben, Perkussion, Auskultation, Klopfschmerz Skelett, Beweglichkeit WS und Extremitäten, Einflussstauung, Thrombophlebitis, neurologische Untersuchung

Labor: BB mit Differenzierung, Kreatinin, TSH, LDH, Ca, GOT, GPT, AP, (Tumormarker eher Ausnahme)

Bronchoskopie optional – v. a. bei zentralen Tumoren