

in Kooperation mit den niedergelassenen Pneumologen

Jahre nach Primärtherapie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Monate nach Primärtherapie	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174
Anamnese	•		•		•				•			•			•
Körperliche Untersuchung	•		•		•				•			•			•
Lungenfunktion (*) u. SO ₂	•		•		•				•			•			•
CT Thorax/ Abdomen mit KM	•		•		•				•			•			•
Octreoscan / Ga-DOTA peptide PET-CT (**)	•				•							•			
Labor	Wenn bei Diagnose erhöht: Chromogranin A und NSE alle 3-6 Monate														
Bronchoskopie	nach OP von zentralen Tu., nach bronchoplast. OP, bei knappen Resektionsrändern od. symptomat. Pat. alle 3-5 Jahre														
Spez. Untersuchungen	je nach Beschwerdebild und / oder auffälligem Befund (z. B. pos. Octreoscan, bek. Knochenmetastasen): MRT														

Individuelle Änderungen sind möglich

(*) Diffusion / BGA bei vorbekannten Einschränkungen bzw. antiobstruktiver Therapie

(**) wenn prä-OP positiv od. unbekannt

Anamnese: AZ, Appetit, Gewicht, Husten, Atemnot, Auswurf, Heiserkeit, Herz, Schmerzen (Charakter), Kopfschmerzen, Schwindel, Gefühlsstörungen, Müdigkeit, Schwäche, Antriebsarmut
Körperliche Untersuchung: Gewicht, Puls, Blutdruck, Inspektion (Knöchelödeme?), Palpation LAB, Narben, Perkussion, Auskultation, Klopfschmerz Skelett, Beweglichkeit WS und Extremitäten, Einflusstauung, Thrombophlebitis, neurologische Untersuchung